

• ORIGEN

El origen más remoto de los camélidos está en el oeste central de los Estados Unidos de Norteamérica (alrededor de los Estados de Nebraska, Colorado, Wyoming y Dakota del Sur). Este origen se remonta de 35.000 a 7.000 años antes de Cristo. Con la aparición de los glaciares y el deterioro de la pradera norteamericana se produjo la emigración hacia Sudamérica. En el Plioceno, al final de la era Terciaria, debido a las malas condiciones climáticas, se produjo la emigración masiva hacia Asia y Sudamérica. Las poblaciones en Asia formaron a los actuales camélidos asiáticos, camellos y dromedarios. En Sudamérica las poblaciones de llamas, alpacas y vicuñas se establecieron a lo largo de la Cordillera de Los Andes (Fuente: *Oro de los Andes*: Flores Ochoa J. y MacQuarrie Kim).

• NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO

- Llama (*Lama glama*)
- Alpaca (*Lama pacos*)
- Guanaco (*Lama guanicoe*)
- Vicuña (*Vicugna vicugna*)

• RAZAS O TIPOS

Especie: Llama "K'aras" o Peladas. Constituyen animales de conformación y cobertura de vellón diferente. La cara y la cabeza están completamente desnudas. Las llamas K'aras pesan más que las Thampullis, producen carne, menos fibra y de menor calidad.



Llama raza K'aras: Feria regional Turco - Oruro. MDRyT, 2011.

Especie: Llama "Thampullis". Conocidas también como Tapadas o Lanudas, son el extremo de animales lanudos, son de menor tamaño y pesan menos que las K'aras, están más relacionadas con las alpacas. La calidad del vellón y el tipo de praderas que usan las alpacas y llamas Thampullis son similares. Tienen la cabeza cubierta de pelos y un mechón sobre la frente.



Llama raza Th'ampulli: Expoferia Nacional Sucre - Chuquisaca. MDRyT 2011.